




144
espèces
communes
du bourg


**PETIT GUIDE
ILLUSTRÉ DE LA
FAUNE DU BOURG
DE MATOURY**

Maël DEWYNTER
Janvier 2024



IBIS VERT

Mesembrinibis cayennensis



Ventre sombre

Trapu et court sur pattes




Pattes ne dépassant pas la queue

HÉRON STRIÉ

Butorides striata




Adulte



Juvenile

JACANA NOIR

Jacana jacana




Adulte (sexes identiques)

Immature



Bec noir



TOUCAN ARIEL

Ramphastos vitellinus

Plastron orangé



ORTALIDE MOTMOT

PARACOUA / *Ortalis motmot*

Ill : J. Norwood

Souvent en groupes
bruyant

PIC OVENTOU

Dryocopus lineatus



Femelle
adulte



Mâle
adulte

GRIMPAR TALAPIOT

Dendroplex picus

Grand bec ivoire
droit

Gorge blanche



Tête et nuque
ponctuées de
blanc

Lignes blanches
courtes,
parallèles





Front vert


Très petit

Mâle adulte

Rémiges bleues

TOUI ÉTÉ

Forpus passerinus



Front jaune

Femelle adulte

Queue courte




Tour de l'œil clair

Tête orangée

Queue longue

CONURE CUIVRÉE

Eupsittula pertinax



Groupes bruyants en vol




Joue jaune

Zone jaune pâle

AMAZONE AOUROU

Amazona amazonica



Miroir orange

Bruyants en vol, souvent en formations rapprochées par deux (rarement par trois)

Queue courte

ARA MACAVOUANNE

Orthopsittaca manilatus

Bas-ventre rouge




Ailes bleue en vue dorsale
Bas-ventre rouge

Bruyants en vol, souvent en formation de nombreux individus (parfois plusieurs dizaines)

Queue très longue

Affectionnent les Palmiers bâches dont ils consomment les fruits




Nuque
"écailleuse"

Gorge
"écailleuse"

COLOMBE À QUEUE NOIRE

Columbina passerina



Tête gris-bleuté

Femelle
adulte

Mâle
adulte

Corps très roux

COLOMBE ROUSSE


Columbina talpacoti



Contour de
l'œil bleu

COLOMBE DE VERREAUX

Leptotila verreauxi



PIGEON ROUSSET

Patagioenas cayennensis

MARTIN-PÊCHEUR À VENTRE ROUX

Megaceryle torquata

Mâle adulte

Femelle adulte

Huppe rabattue

Espèce massive

Ventre entièrement roux

Poitrine gris bleuté



Femelle adulte

JACAMAR VERT

Galbula galbula

Gorge blanche

Mâle adulte

Gorge rousse

Femelle adulte

Mâle adulte

MOINEAU DOMESTIQUE

Passer domesticus

Espèce originaire d'Europe, parvenue en Guyane en 1994

Commun dans le bourg de Matoury, sur les parkings et les pelouses urbaines

Femelle


TANGARA À BEC D'ARGENT

Ramphocelus carbo

Mandibule blanche

Mâle adulte

Femelle et immature



TANGARA ÉVÈQUE

Thraupis episcopus

Dominante gris-bleu



TANGARA DES PALMIERS

Thraupis palmarum

Dominante vert-olive



TANGARA À GALONS BLANCS

Tachyphonus rufus

Mandibule claire

Tache blanche discrète. Surtout visible en vol

Mâle adulte

Mâle immature

Patchwork de roux et de noir

Femelle adulte

Entièrement rousse



Mâle adulte

ORGANISTE TÉITÉ

Euphonia violacea

Menton jaune

jaune

Femelle et immature

SUCRIER À VENTRE JAUNE

Coereba flaveola

TODIROSTRE FAMILIER

Todirostrum cinereum

CALLISTE DIABLE-ENRHUMÉ

Tangara mexicana

Sourcil blanc

SALTATOR DES GRANDS-BOIS

Saltator maximus

Bec fort

Dos olive

Grande tache noire au centre poicbe

Ventre gris

Grand passereau forestier commun dans les friches et abattis.

BATARA RAYÉ

Thamnophilus doliatus

Mâle en alerte

Mâle adulte



Femelle adulte

GOBEMOUCHERON TROPICAL

Poliptila plumbea

Calotte noire


Mâle adulte

Queue noire

Femelle adulte

Joue et gorge blanches

Rectrices externes blanches



Finement barré

TROGLODYTE FAMILIER

Troglodytes aedon

Dos roux

Gorge blanche


TROGLODYTE CORAYA

Pheugopedius coraya



Bec bicolore
à base rose

Huppe avec des
plumes blanches



ÉLÉNIE À VENTRE JAUNE

Elaenia flavogaster

Huppe



TYRANNEAU PASSEGRIS

Camptostoma obsoletum

Très petit

Tête "lisse"
Pas de huppe

Sourcil clair

TYRANNEAU SOURIS

Phaeomyias murina



Barres alaires
beiges

Bec très
court

TYRANNEAU ROITELET

Tyrannulus elatus

Huppe avec des
plumes jaune vif

Barres alaires
jaunes



TYRAN PITANGUA

Megarynchus pitangua

Bec très gros,
'démessuré'

Ressemble de loin à un
Tyran quiquivi, mais bec
bien plus massif



Bec fort

TYRAN QUIQUIVI

Pitangus sulphuratus



Bec court

TYRAN DE CAYENNE

Myiozetetes cayanensis




Masque sombre

TYRAN MÉLANCOLIQUE

Tyrannus melancholicus

Poitrine
olivâtre





TYRAN PIRATE

Legatus leucophaeus

Poitrine
striée

Couvertures bordées
de blanc





Immature

Tête grise, joue striée

MERLE LEUCOMÈLE

Turdus leucomelas

Adulte




Contour de l'œil jaune

MERLE À LUNETTES

Turdus nudigenis

Chant évoquant le miaulement d'un chat



Attitude au sol, ailes pendantes, queue redressée

MOQUEUR DES SAVANES

Mimus gilvus

Coins de la queue blancs



Mâle adulte

STURNELLE MILITAIRE

Sturnella militaris

Femelle et immature

Très petit

JACARINI NOIR

Volatinia jacarina

Femelle
et immature

Poitrine
striée

Mâle
adulte

SPOROPHILE À AILES BLANCHES

Sporophila americana

Bec épais,
arrondi

Femelle
et immature

Mâle
adulte

Iris noir

VACHER LUISANT

Molothrus bonariensis

Mâle adulte

Femelle adulte

Iris jaune

QUISCALE MERLE

Quiscalus lugubris

Rectrices inclinées à 45°
Queue typique en forme de feuille
repliée en V.



Les deux sexes
sont identiques.

COLIBRIS



Bande blanche sur la poitrine

Queue bronze, à marge blanche



Point blanc derrière l'œil

ARIANE DE LINNÉ

Chionomesa fimbriata

Mandibule rose

COLIBRI À MENTON BLEU



Chlorestes notata



Bec court

Menton bleu

Mâle adulte




Femelle adulte

Queue courte bleu nuit

ERMITE HIRSUTE

Glaucis hirsutus



Long bec courbe à mandibule jaune

Queue courte



Queue tricolore, rousse, noire à marge blanche

ERMITE ROUSSÂTRE

Phaethornis ruber

Très petit colibri des sous-bois

Les mâles sont parfois regroupés en *leks* : ils émettent des petits cris, *pst... pst... pst...* puissants, depuis une brindille dans le sous-bois.

Mandibule jaune

Mâle adulte

Bande noire



Femelle adulte

Extrémité de la queue rousse



CACIQUE CUL-JAUNE

Cacicus cela



Iris noir

ANI À BEC LISSE

Crotophaga ani



Iris blanc

ANI DES PALÉTUVIERS

Crotophaga major

Bleu métallique



*Queue très
longue aux
reflets
violacés.*

MARTINET POLIOURE

Chaetura brachyura

Très
sombre

Queue
courte



MARTINET CLAUDIA

Tachornis squamata

Queue effilée

Ventre pâle



HIRONDELLE CHALYBÉE

Progne chalybea



Gorge
enfumée

HIRONDELLE TAPÈRE

Progne tapera




Bande pectorale
sombre

Gorge
blanche

Ailes
"pendantes"



Gorge
enfumée



Cravate
sombre



Ailes
blanches



Ventre
blanc

HIRONDELLE À AILES BLANCHES

Tachycineta albiventer

Patches blancs sur
les ailes (parfois
absents)



RAPACES

Rémiges primaires rousses



BUSE À GROS BEC

Rupornis magnirostris

Adulte

Petite buse très commune



Très pâle



BUSE CENDRÉE

Buteo nitidus

Adulte

Coloration générale gris pâle



Forme claire

Menton blanc

BUSE À QUEUE COURTE

Buteo brachyurus

Adulte

Forme claire à ventre blanc



Forme sombre



Queue très courte ne dépassant pas des ailes

La petite buse se décline en deux formes : une forme sombre, de coloration homogène chocolat et une forme claire, bicolore avec une fort contraste dos sombre, ventre blanc

RAPACES



Immature

Corps blanc

HARPIE FÉROCE

Harpia harpyja



Adulte

Collier noir

Le plus grand aigle d'Amérique du Sud



Adulte

BEC-EN-CROC DE CAYENNE

Leptodon cayanensis



Adulte

Ventre blanc

Dos gris ardoisé très sombre



Immature

Deux barres noires sur la queue

Les immatures de *Leptodon* miment les trois grands aigles du genre *Spizaetus*. Ici la forme "Aigle noir et blanc". On peut aussi observer la forme "Aigle tyran", toute noire, et très rarement la forme "Aigle orné".

CARACARA À TÊTE JAUNE

Milvago chimachima



Immature

Ventre
beige




Patch
blanc

Adulte



URUBU NOIR

Coragyps atratus



Main
blanche

Queue
courte

Envergure
~ 1,5 m



Adulte

CHOUETTE À LUNETTES

Pulsatrix perspicillata

Immature

Le chant caractéristique
évoque le bruit d'une
tôle que l'on secoue.



Poussin




PRIMATES



TAMARIN À MAINS DORÉES

Saguinus midas

Très petit
Parait tout noir (bien que le dos soit brun-roux)
Pattes orange



SINGE ÉCUREUIL

SAÏMIRI

Saimiri sciureus

Petit et vif, en grandes bandes bruyantes
Extrémité de la queue noire
Pattes orange



Femelle : favoris noirs

Mâle

MARSUPIAUX

PIAN À OREILLES NOIRES

Didelphis marsupialis

Court manchon de poils sombres à la base de la queue

Base et extrémité des oreilles noire



QUATRE-YEUX GRIS

Philander opossum

Long manchon de poils à la base de la queue
Queue bicolore
Arboricole

Taches crème au-dessus des yeux




GRAND OPOSSUM LAINEUX ARBORICOLE

Caluromys philander

Manchon de poil étendu ; extrémité de la queue mouchetée de blanc
Ventre orangé
Ligne sombre le long du museau

Poids : de 250 g à 450 g




OPOSSUM-SOURIS MURIN

Marmosa murina

Poids : 70 g maximum

Queue longue avec un court manchon de poil
Queue de coloration chair homogène
Masque noir assez prononcé
Ventre chamois





CABIAÏ

Hydrochoerus hydrochaeris

Rongeur énorme
Entièrement beige à brun
A proximité des cours d'eau



AGOUTI

Dasyprocta leporina

Grand rongeur
Cul orange très caractéristique
Queue très courte



PAC

Agouti paca

Grand rongeur
Livrée marron
tachetée de blanc



COENDOU À QUEUE PRÉHENSILE

POTOPIC

Coendou prehensilis

Grand
Couvert de piquants noir et blanc
Longue queue préhensile à
extrémité de couleur chair



ÉCUREUIL DES GUYANES

GRAND GUERLINGUÉ

Guerlinguetus aestuans

Grand écureuil (~ 200 g)
Démonstratif, queue souvent
positionnée au-dessus du corps
Face ventrale beige à orange



TATOU DES GUYANES

Dasypus sp

Poids : de 3 à 6 kg



Aï

PARESEUX À TROIS DOIGTS

Bradypus tridactylus

Livrée de camouflage, de teinte grise à reflets verdâtres
Face sympathique de clown, beige clair

Le mâle présente une tache orange et noire au milieu du dos



UNAU

PARESEUX À DEUX DOIGTS

Choloepus didactylus

Grand paresseux à "long nez de cochon", de coloration unie
Pelage long et hirsute

Bien plus rapide que l'Aï

Méfiance : capable d'infliger des blessures sévères (morsures et griffures)



TAMANDUA

Tamandua tetradactyla

Forme mélanique assez rare



Longue queue préhensile

Poids : 3,5 à 8,4 kg
Pelage beige avec un "veston" plus sombre





ALLOBATE FÉMORAL

Allobates femoralis

Petite espèce commune de la litière forestière

Chant typique : ... cimi cimi... cimi cimi... souvent entendu en forêt

Flancs noirs séparés du dos brun par une ligne claire
Ventre noir tacheté de blanc
Lèvres blanches



CRAPAUD AGUA / CRAPAUD BUFFLE

Rhinella marina

Juvenile

Omniprésent dans les paysages anthropisés : savanes inondées, prairies, jardins et bords de route

Le chant est un long roulement doux



Mâle

Grand crapaud avec des glandes parotoïdes très développées et un museau caréné

Coloration beige uni (mâles) ou avec des macules noires ou rousses (juvéniles et femelles)
Iris doré



ADÉNOMÈRE DES HERBES

Adenomera hylaedactyla

Commune dans les zones herbacées : jardins, friches, savanes, bords de routes

Chant typique pit pit pit pit... très rapide



Coloration à base de taches sombres, souvent verdâtres voire "persillées"

ADÉNOMÈRE FAMILIÈRE

Adenomera andreae

Abondante dans les jardins, les boisements et en périphérie des zones ouvertes.

Chant typique, puit puit.... puit... lent.

Grande diversité de colorations et de motifs avec souvent une fine ligne orange dans le bas du dos. Présence régulière de bandes orange latérales.





LEPTODACTYLE GÉANT

Leptodactylus pentadactylus

Grande espèce forestière, commune
Chant : *Whououp...* très puissant et grave
lancé pendant les averses

Un long bourrelet continu
s'étend de l'œil à la base de l'aine
Les flancs des adultes ont
une teinte dominante jaune



Juvenile

LEPTODACTYLE DE PETERS

Leptodactylus petersii

Espèce commune des bas-fonds
marécageux forestiers

Chant : succession lente de *puit...*
puit... doux, assez discrets, émis
environ toutes les secondes

Teinte générale grise à verdâtre
avec des bourrelets dorsaux discontinus
On note souvent un triangle sombre sur la tête



Ventre blanc cassé, cuisses
grisâtres, discrètement
vermiculés de gris

LEPTODACTYLE DE TRINIDAD

Leptodactylus nesiotus

Espèce des zones humides ouvertes :
savanes et prairies inondées
Parfois en bordure de forêt

Chant : succession rapide
de *pit... pit... pit...* émis au rythme de
plusieurs par seconde

Teinte générale grise à brune
avec des bourrelets dorsaux discontinus
Flancs souvent beige à orangé



Ventre blanc cassé à beige
immaculé (peu ou pas de
taches).

LEPTODACTYLE GALONNÉ

Leptodactylus fuscus

Espèce assez commune dans les zones
herbacées : savanes, friches herbacées et
grandes pelouses

Chant : sifflement bref *oui... oui...* puissant et
assez mélodieux


Teinte générale grise à verdâtre avec
des macules irrégulières
Présence de longs bourrelets (plis)
dorsaux sur le dos et les flancs



RAINETTE ÉPERONNÉE

Boana calcarata

Teinte beige à brune voire rousse
Souvent une longue ligne vertébrale sombre
Talons prolongé par un long éperon de peau



Espèce forestière des rives
et des bas-fonds marécageux




Flancs et faces cachées des
cuisses bleutés, tigrés de noir

RAINETTE À BANDES

Boana multifasciata

Commune. Parfois dans les
fossés des jardins.
Espèce nocturne des zones
humides littorales

Teinte générale beige à
brune. Souvent des motifs
tigrés sur le dos ou une
longue ligne sombre
vertébrale



Ligne jaune sur les talons et
au-dessus du cloaque

Coloration de jour, très pâle


RAINETTE DES PRIPRIS

Boana raniceps

Rare
Espèce nocturne
des zones humides
littorales : pripris,
marais côtiers

Teinte générale beige à brune
Face postérieure des cuisses
marquée de barres sombres
Tympan de coloration bien plus
sombre que la face dorsale





Femelle

Mâle

RAINETTE DE COURTOIS

Boana courtoisae

Petite rainette nocturne des bas-fonds marécageux et des bords de mares forestières permanentes

Aine et faces cachées des cuisses jaune, verdâtre, parfois bleu pâle, tachetées de noir

Iris unicolore doré

RAINETTE À BANDEAU

Dendropsophus leucophyllatus

Espèce nocturne des mares forestières et des marais côtiers

Superbe livrée à base de grandes bandes et de macules jaunes sur fond brun à rouge



Face ventrale rose.




Coloration de jour

RAINETTE PONCTUÉE

Boana punctata

Petite rainette nocturne des zones humides littorales

Teinte générale verte (de jour) à orange (la nuit). Présence de lignes dorsolatérales bicolores (rouge & jaune) s'étendant de l'œil à l'aine



Coloration nocturne


Coloration diurne

RAINETTE CENTROLÈNE

Boana cinerascens

Petite rainette nocturne des forêts inondables

Teinte générale verte (de jour) à jaunâtre (la nuit)
Points de couleur rouille sur le corps
Grandes taches rouille sur les paupières et le dessus du crâne



Coloration diurne

Coloration nocturne

SCINAX DES MAISONS

Scinax ruber



Très commun dans les maisons et jardins
Galope souvent sur les murs à la nuit tombée

Chant : *praaaa...* rauque et aiguë



Deux bandes latérales claires, s'étendant de l'œil jusqu'à l'aîne, encadrées par deux bandes plus sombres
En période de reproduction, les mâles sont jaunes



SCINAX VARIABLE

Scinax x-signatus

Commun dans les maisons et jardins.

Macules allongées sur le dos
Généralement une à deux paires de taches en forme de boomerang
En vue dorsale, ces taches forment un) (

En période de reproduction, les mâles ont une teinte jaune à verdâtre

SCINAX DE BOESEMANN

Scinax boesemani

Parfois dans les jardins
Surtout à proximité de zones humides

Un trait sombre traverse l'œil depuis la narine jusqu'au-delà du tympan





Livrées nocturnes

RAINETTE À DOIGTS ORANGE

Dendropsophus sp. 1

Espèce nocturne des zones humides forestières (rives des criques, mares temporaires, bas-fonds)



Livrée diurne

Teinte générale beige à rousse
Souvent une tache claire sous l'œil



Gorge et sac vocal des mâles vert à bleuâtre

RAINETTE NAINE

Dendropsophus walfordi

Minuscule rainette savanicole qui se retrouve dans la végétation herbacée des chenaux et fossés urbains

Le chant est une succession rapide de clics puissants



Livrées nocturnes

Teinte générale beige à rousse
Souvent des points sombres diffus sur le dos



Livrée diurne



Gorge et sac vocal orangés

OSTÉOCÉPHALE TAURIN

Osteocephalus taurinus

Grande rainette des mares forestières temporaires et des bas-fonds

Coloration variable
Flancs souvent beige à jaune avec des macules sombres



Iris jaune rayonné

ÉLEUTHÉRODACTYLE DE JOHNSTONE

Eleutherodactylus johnstonei



Espèce exotique
Très anthropophile : répartition limitée aux jardins avec quelques observations ponctuelles en milieu naturel

Chant : *tui...tui...tui* très puissant
Ambiance antillaise

Motifs dorsaux variables
Souvent un triangle clair sur le museau, deux bandes latérales et/ou un fin liseré clair sur les cuisses et le dos

ÉLACHISTOCLE DU SURINAME

Elachistocleis surinamensis



Petite espèce fousseuse des savanes inondées et des prairies humides que l'on entend parfois dans les chenaux en ville

Le chant puissant, un long buzz désagréable à l'oreille, se fait entendre pendant les fortes pluies




Teinte générale marron à grise
Ventre caractéristique gris bleuté avec des taches jaunes ou orange

Reptiles

CAÏMANS

Écaille tympanique rousse



CAÏMAN ROUGE

Paleosuchus palpebrosus

La plus commune des 4 espèces dans le bourg de Matoury. Dans les pripris et les savanes inondées

Subadulte



Taille moyenne d'un mâle : 1,40–1,60 m
(taille maximale : 1,80 m)
Taille d'une femelle : 1,20–1,60 m

LÉZARDS

IGUANE COMMUN



Iguana iguana



Juvénile

Grand lézard vert tendant vers une coloration grise avec l'âge
La queue est annelée de noir

Assez commun dans les jardins et les friches, souvent posté immobile dans la végétation, parfois haut dans les arbres



Méfiance : les adultes, lorsqu'ils sont acculés, sont capables de donner de grands coups de fouets avec leur queue

ANOLIS DE LA GUADELOUPE

Ctenonotus marmoratus

Espèce exotique originaire de la Guadeloupe
Très anthropophile : répartition limitée aux jardins



Mâle

Les mâles ont une coloration verte très vive, pouvant virer au brun sous l'effet du stress ou de la température
Le fanon mobile est jaune vif



Les femelles ont une livrée plus terne, gris à brune, avec souvent un motif plus clair le long de la colonne vertébrale



Mâle



Femelle

POLYCHRE CAMÉLÉON

LÉZARD CAMÉLÉON

Polychrus marmoratus

Lézard arboricole des lisières forestières

Très longue queue



La livrée évolue très vite selon le stress, passant du vert pomme au brun foncé
 Corps : lignes obliques jaunes sur fond vert à brun
 Œil très mobile (rappelant celui d'un caméléon) avec des rayons noirs

KENTROPYX DES CHABLIS

Kentropyx calcarata

Lézard terrestre, très agile dans la végétation également, fréquentant les chablis pour s'exposer au soleil

Juvenile : trois lignes vertes "fluo" s'étendant sur la tête et l'avant du corps



Juvenile


AMEIVE COMMUN

Ameiva ameiva

Grand lézard terrestre recherchant les places ensoleillées

Mâle adulte : corps vert, queue bleue, tête beige vermiculée

Femelle et juvénile : corps brun, tête verte, ligne dorsolatérale sombre



Mâle adulte

Juvenile



GECKO MABOUIA

Hemidactylus mabouia

Espèce exotique originaire d'Afrique
Très anthropophile : répartition limitée
aux zones urbaines

Nocturne : souvent posté dès le
crépuscule sur les murs éclairés



Selon le stress, la luminosité ou le support,
la coloration varie du beige très pâle à une
livrée sombre contrastée
de brun et de gris

Nombreux tubercules sur
la nuque et le dos donnant
un aspect granuleux



Queue avec des anneaux
d'écailles pointues en forme d'épines



THÉCADACTYLE À QUEUE TURBINÉE

Thecadactylus rapicauda


Grand gecko forestier nocturne

Souvent observé dans la charpente des
abris de panneaux ou celle des carbets
sur les sentiers aménagés en forêt



Livrée peu variable
Présence d'une fine bande claire en arrière de l'œil

Palmure des mains
et des pieds très
développée,
en patte d'oie



Palmure des
mains et des
pieds très
développée

Queue souvent régénérée et
très élargie à la base (en forme
de carotte ou de navet)



Juvénile



Mâle

GONATODE DES CARBETS

Gonatodes humeralis

Petit gecko forestier, diurne et arboricole

Souvent posté à la base des troncs, prompts à fuir dans les cavités offertes par les contreforts



Femelle

Dimorphisme sexuel marqué

Les mâles présentent une petite virgule jaune au-dessus de l'insertion des membres antérieurs et une tache sombre sur l'épaule

La coloration de la tête marie des tons jaunes et rouges plus ou moins vifs



La femelle a une teinte plus terne et discrète avec des motifs qui lui permettent de se fondre dans le décor : alternance de taches sombres et claires
La virgule claire est également bien présente

GYMNOPHTHALME D'UNDERWOOD

Gymnophthalmus underwoodi



Petit lézard terrestre qui se chauffe et se faufile dans les litières sèches et ensoleillées
Souvent en lisière : particulièrement actif aux heures les plus chaudes.

Longueur du corps (sans la queue) inférieure à 4,5 cm
Lèvres et joues sombres



Absence de paupière mobile (L'œil ne peut pas se fermer : il est recouvert d'une écaille transparente comme un verre de lunette)



TÉJU COMMUN

SAUVEGARDE

Tupinambis teguixin

Grand lézard terrestre, rappelant un varan
Se déplace lentement, en quête de nourriture
Très craintif et prompt à fuir

Longue queue annelée



Juvenile

SERPENTS



GRAGE PETITS CARREAUX

Bothrops atrox

Sûrement l'espèce de serpent la plus observée en Guyane
Discret, souvent lové le long des sentiers ou figé, tout en longueur, en travers d'un layon
Peu agressif, mais sa morsure est dangereuse et nécessite une hospitalisation

Se reconnaît à sa livrée constituée de "carreaux", très cryptique dans la litière, et à cette grande marque noire allongée en arrière de l'œil

Les juvéniles ont l'extrémité de la queue jaune



BOA BRODÉ BOA D'AMAZONIE

Corallus hortulanus

L'un des serpents les plus observés en Guyane
Arboricole et nocturne
Les rétines réfléchissent la lumière des lampes frontales

Plutôt agressif, mais sa morsure n'est pas dangereuse

*La livrée est très variable
Les adultes sont majoritairement gris ou beiges avec des macules sombres*

Les juvéniles présentent parfois des colorations sublimes à base de orange ou de rouge



Juvéniles



Juvéniles



ANACONDA GÉANT

Eunectes murinus

Grand boa, nocturne, aquatique, qui fréquente les ripris, chenaux et les criques forestières

Peu agressif
La morsure, bien que douloureuse, n'est pas dangereuse



*La livrée est olivâtre avec des grandes taches noires disposées le long du corps.
On note également des ocelles sur la partie inférieure des flancs*

Une bande noire s'étend en arrière de l'œil : chez les jeunes individus, elle souligne une zone orangée



Juvénile



Adulte

CHASSEUR MASQUÉ

Chironius fuscus

Grande couleuvre forestière diurne, très vive et active
L'un des serpents les plus communs de Guyane

Masque noir en arrière de l'œil
Lèvre blanche frangée de roux



Juvenile

Adulte coloration brun roux avec une bande vertébrale claire bordée de noir
La livrée juvénile est annelée de clair : ces anneaux perdurent, plus discrets, chez l'adulte



Adulte

CHASSEUR À FLANC BLEU

Chironius carinatus


Grande couleuvre des savanes et friches, diurne, très vive et active

Dos très sombre, brun à gris anthracite
Ventre jaune : chaque écaille est bordée de noir

Le premier rang d'écailles dorsales, (directement en contact avec les écailles ventrales) a une teinte bleuâtre : ces écailles sont jaunes à l'avant du corps



Juvenile



Juvenile

CHASSEUR DES JARDINS

Mastigodryas boddaerti

La couleuvre la plus commune dans les jardins guyanais
Diurne et terrestre



La coloration évolue avec l'âge
Les juvéniles présentent une livrée avec une succession d'anneaux clairs et sombres
Les adultes ont une livrée beige ou rousse, homogène, avec une longue ligne beige claire sur les flancs
La tête des adultes est grise





LIANE COIFFÉE


Thamnodynastes pallidus

Petit serpent-liane, arboricole et nocturne, commun dans les friches et forêts secondaires de l'île de Cayenne



Livrée à base de fines bandes longitudinales lui conférant un camouflage efficace dans la végétation herbacée

En situation de stress, la Liane coiffée aplatit totalement l'avant de son corps et "coiffe" comme un Cobra : des motifs sinueux jaune pâle apparaissent alors, rendant le comportement encore plus impressionnant



LIANE PERROQUET

Leptophis ahaetulla

Superbe serpent-liane, arboricole et diurne, que l'on observe dans les jardins, les friches et forêts secondaires de l'île de Cayenne

Comportement de défense très particulier; gueule grande ouverte face à la menace



Livrée verte avec une bande vertébrale dorée et deux bandes latérales jaunes
Lèvres blanches
Bande noire en arrière de l'œil

TORTUES




TORTUE DENTICULÉE

Chelonoidis denticulatus

Grande tortue terrestre croisée régulièrement sur les sentiers forestiers

Écailles orange sur les pattes et sur le dessus de la tête.



Juvenile

Taille du nouveau-né : de 4,6 à 5,2 cm

Taille adulte : de 23 à 82 cm



RHINOCCLEMMYDE PONCTUÉE

TORTUE PONCTULAIRE

Rhinoclemmys punctularia

Tortue aquatique qui s'observe dans les petits marais (pri-pri), les chenaux et les petites criques forestières

Motifs de la tête et du cou en forme de points, virgules, boucles et courbes de couleurs rouges et jaunes



Juvenile

Taille du nouveau-né : 5,9 cm

Taille adulte : de 10,5 à 26 cm



TORTUE SCORPION



CINOSTERNE DE L'AMAZONE

Kinosternon scorpioides

Tortue aquatique qui s'observe dans les petits marais (pripris), les chenaux et les petites criques forestières

Dossière bombée avec 3 carènes longitudinales

Plastron composé de 11 plaques, articulé grâce à des charnières disposées de part et d'autre des écailles abdominales
Bec puissant et crochu



Taille du nouveau-né de 2,3 à 3,7 cm

Taille adulte : de 10,5 à 27 cm

NYPHALIDAE

NYPHALE CENDRÉ

Anartia jatrophae




NYPHALE ÉCARLATE

Anartia amathea



Mâle



Femelle

JUNONIA GENOVEVA

40-55 mm



Inféodée aux milieux ouverts

Grand risque de confusion avec d'autres espèces de *Junonia* (au moins 3 espèces) présentes sur la commune



Silhouette très élancée
Coloration orange vif dominante

FLAMME EXALTÉ

Dryas alcionea



Marques noires plus ou moins étendues



HÉLICONIUS ERATO

Heliconius erato hydra

Ill. : O. Sculfort



ERESIA NAUPLIUS



DYNAMINE POSTVERTA



Face ventrale plus ou moins identifique chez les sexes



Femelle



Mâle



SATYRE DE PÉNÉLOPE

Cissia penelope




Mouchetures
noires



Petites
virgules

5 ocelles



6 ocelles

SATYRE D'HERMÈS

Hermeuptychia hermes



Il s'agit d'un groupe complexe,
avec plusieurs espèces cryptiques

Petit satyre commun des sous-bois.
Vol près du sol et se pose souvent à
faible hauteur

PAPILLON THOAS

Heraclides thoas



PAPILLONIDAE

HESPERIIDAE

HESPÉRIES

Urbanus sp.



Une dizaine d'espèces du genre
Urbanus – de grandes hespéries à
longues queues – ont été observées
sur l'île de Cayenne. Leur distinction
demeure pour l'instant une "affaire
de spécialiste".

RIODINIDAE

PARVOSPILA LUCIANUS

Mâle



20–25 mm




Femelle



Souvent perché sous les feuilles

Face ventrale très blanche

Mâle



PARVOSPILA EMYLIUS

Mâle



23–27 mm




Femelle



Souvent perché sous les feuilles

Face ventrale blanche

Mâle



NYPHIDIUM CARICAE

28–37 mm



Souvent perché sous les feuilles



LYCAENIDAE

THÉCLA DE LA SENSITIVE


Ministrymon azia



18 mm

Minuscule

Face dorsale marron glacé à reflets brillants



Ligne marginale rouge

Ligne rouge hachurée et bordée de blanc sur les deux ailes

Deux taches rouges

PIERIDAE


SOUFRÉ BICOLORE

Pyrisitia venusta



24-37 mm

Jaune immaculé



Point noir

Ailes antérieures jaune vif

Mâle

Ailes postérieures blanchâtres à jaunâtres



Ailes antérieures jaune très pâle

Ailes postérieures blanchâtres

Femelle



PIÉRIDE DE LA MÉDAILLE

Aphrissa statira



50-62 mm

Ailes immaculées
Jaune-verdâtre



Mâle

Point noir

Femelle

Fin liseré noir





Si la commune de Matoury s'étend sur quelques 137 km², le bourg, au sens strict, est bien moins étendu. Dans le cadre de ce petit guide, nous avons considéré les principales espèces animales observées dans une zone circonscrite par la Route de l'est (RN2) à l'ouest, la Matourienne au sud et à l'est et le chemin Gibelin au nord (voir carte ci-dessous).

Le nord de cette zone est urbanisé et densément peuplé : il accueille une faune très généraliste des jardins guyanais... Mais le sud de la zone, qui constitue un corridor écologique majeur de la commune, offre une mosaïque de milieux naturels. Cela permet à une faune plus "sauvage" de venir au contact de la ville et de ses habitants. À Matoury, la forêt et les prairies ne sont jamais loin et certaines espèces emblématiques, comme la Harpie féroce, peuvent s'inviter à la marge des habitations.

Ce petit guide présente 144 espèces (Oiseaux, Mammifères, Reptiles, Amphibiens et Papillons de jour) parmi les plus abondantes.

C'est une initiation car une faune bien plus riche habite le bourg !

Les naturalistes y ont ainsi dénombré à ce jour :

- 262 espèces d'Oiseaux (67 sont illustrés)
- 30 espèces de Mammifères (15 sont illustrées)
- 47 espèces de Reptiles (22 sont illustrés)
- 30 espèces d'Amphibiens (23 sont illustrés)
- 47 espèces de Papillons (17 sont illustrés)

Et l'inventaire continue...

D'autres groupes non illustrés ici, comme les Chauves-souris, les Poissons, les Membracides et la Flore, font également l'objet d'études.



Vers la
réserve
naturelle





ABC Matoury

Atlas de la Biodiversité
Communale

Ce guide a été réalisé grâce au soutien de l'Office français de la biodiversité et de l'opération "Aux Arbres Citoyens !". Merci à **Ilona Clocher** de la SEPANGUY et **Thibaut Foch** de l'ONF qui ont porté ce projet. Le choix des espèces illustrées provient d'une analyse des données naturalistes saisies sur le site Faune-Guyane. Un grand merci à tous les contributeurs de Faune-Guyane.



Ce document a été financé par l'Office français de la biodiversité (OFB) et par France Nature Environnement (FNE).



SEPANGUY

Société d'Étude, de Protection & d'Aménagement de la Nature en Guyane



Ville Solidaire

L'Atlas de la biodiversité communale de Matoury est piloté par la Société d'Étude, de Protection et d'Aménagement de la Nature en Guyane (SEPANGUY) en lien avec la Mairie de Matoury.



MINCE ! IL A DISPARU TROP VITE. C'ÉTAIT UN JAGUAR NON ?

CONCEPT, ILLUSTRATIONS & INFOGRAPHIE : © MAËL DEWYNTER / GOODID (JANVIER 2024)

TOUTES LES ILLUSTRATIONS SONT DE L'AUTEUR À L'EXCEPTION DE :

HELICONIUS ERATO (OMBELINE SCULFORT) & ORTALIS MOTMOT (JULIEN NORWOOD)