

Maël Dewynter  
Antoine Baglan  
Élodie Courtois  
Thierry Frétey  
Mickaël Sanchez  
Jérémy Souchet  
Jean-Michel Probst

Numéro  
Juillet 2026  
**27**

# GUIDE ILLUSTRÉ DES REPTILES & DES AMPHIBIENS DE LA RÉUNION



## Crapauds / Bufonidae

ESPÈCE EXOTIQUE



**CRAPAUD GUTTURAL**

NA

*Sclerophrys gutturalis*

Grand crapaud à l'allure ramassée, globuleuse, aux membres courts et robustes, au museau court et arrondi

Mœurs terrestres

Mensurations

Lmc adulte : 7 à 10 cm

Glandes parotoïdes



Face cachée des cuisses parfois rouge

## Grenouilles / PTYCHADENIDAE

ESPÈCE EXOTIQUE



~1790

### GRENOUILLE DES MASCAREIGNES

*Ptychadena mascareniensis*

NA


Mœurs terrestres

Mensurations

Lmc adulte : 4 à 6 cm

Grenouille élancée, aux membres longs et fins, adaptés au saut, à museau pointu

Dos brun à vert, parcouru de plis longitudinaux le long desquels s'alignent des taches sombres, formant un motif pointillé



## Agames / AGAMIDAE

ESPÈCE EXOTIQUE



~1995

**AGAME DES ROCHES**

*Agama picticauda*

NA

### Mensurations


Lmc nouveau-né : 30–59 mm

Lmc mâle adulte : jusqu'à 15,4 cm

Lmc femelle adulte : jusqu'à 12,9 cm

Ltotale mâle adulte : 40–55 cm

Ltotale femelle adulte : 25–30 cm



Mâle adulte



Mâle adulte, sombre, sous l'effet du stress ou d'une confrontation avec un autre mâle



Femelle, livrée claire



Femelle, livrée sombre

## Agames / AGAMIDAE

ESPÈCE EXOTIQUE



**AGAME DU DECCAN**

*Calotes vultuosus*

NA

Mensurations

Ltotale adulte : 25–50 cm

Crête très  
développée

Mâle  
adulte

Joues gonflées

Femelle & juvénile

Mâle en période  
de reproduction

Renflement  
des hémipenis

Femelle

# Caméléons / CHAMAELEONIDAE

ESPÈCE EXOTIQUE



~1829

**CAMÉLÉON PANTHÈRE**

**ENDORMI**

**NA**

*Furcifer pardalis*




Mâle adulte




Mâle adulte



Femelle



Femelle



Femelle

## Mensurations

Lmc nouveau-né : ~20 mm

Ltotale nouveau-né : ~55 mm

Lmc mâle adulte : 10,3–25 cm

Lmc femelle adulte : 7,4–16,7 cm

Ltotale mâle adulte : jusqu'à 52 cm

Ltotale femelle adulte : jusqu'à 37,7 cm

## Scinques / SCINCIDAE

### ESPÈCE INDIGÈNE



### Mensurations

Lmc adulte : 35–45 mm

Ltotale adulte : 78–150 mm

Œil toujours apparent, la paupière inférieure étant fixe et transparente, formant une véritable "fenêtre" protectrice

### SCINQUE MARITIME

*Cryptoblepharus boutonii boutonii*

CR

RE ?

Petit lézard élancé, à l'aspect lisse et brillant, brun à brun gris, finement moucheté de clair et de sombre

Deux bandes dorsolatérales claires, bordées de noir, s'étendant de l'œil à l'aîne

Corps allongé, à membres grêles

Tête étroite, à museau pointu et œil relativement grand

Queue longue et fine, dans le prolongement du corps



Après plus d'un siècle sans aucune observation – la dernière donnée datant alors de 1860 – l'espèce avait été considérée comme disparue de La Réunion. Mais en 1999, une très petite population a été redécouverte sur une falaise du sud de l'île. L'espèce n'a toutefois plus été détectée depuis 1999, malgré plusieurs campagnes de prospections intensives menées dans les années 2010.

## Geckos / GEKKONIDAE

ESPÈCE EXOTIQUE



**GECKO INDOPACIFIQUE**

*Hemiphyllodactylus typus*

NA

### Mensurations


Lmc nouveau-né : 14–19,5 mm

Ltotale nouveau-né : 28–38 mm


Lmc adulte : 38–60 mm

Ltotale adulte : 70–80 mm

Aspect très élancé (corps "disproportionné")  
Absence de tubercules sur la nuque et le dos  
(aspect velouté)



Main et pied : le doigt I est vestigial et  
en grande partie fusionné au doigt II



Queue longue et fine, préhensile,  
sans étranglement à la base

Face ventrale de la queue  
rouge brique à orange

## Geckos / GEKKONIDAE

ESPÈCE EXOTIQUE



**GECKO BRIDÉ**

*Hemidactylus frenatus*

NA

Absence de tubercules sur la nuque  
(aspect velouté) et quelques rangées de  
petits tubercules sur le corps

### Mensurations


Lmc nouveau-né : 22 mm

Ltotale nouveau-né : 27–34 mm


Lmc mâle adulte : 35–67 mm

Lmc femelle adulte : 39–61 mm

Ltotale adulte : jusqu'à 14 cm



Aspect velouté




Bande claire soulignée de  
sombre de part et d'autre  
de l'œil

**Mains** : doigts élargis en spatule, présentant  
quelques rangées de lamelles (~6–7)

Doigts portant une longue griffe (dépassant  
largement des lamelles)



**Pieds** : les lamelles digitales  
atteignent la base des orteils  
IV et V



## Geckos / GEKKONIDAE

ESPÈCE EXOTIQUE



**GECKO À PETITES TACHES**

*Hemidactylus parvimaculatus*

NA

### Mensurations

Lmc nouveau-né : 20,6 mm

Ltotale nouveau-né : ~35 mm



Lmc adulte : 40–68 mm

Ltotale adulte : jusqu'à 15 cm


Présence de nombreux grands tubercules, carénés, sur la nuque et le corps

14 à 25 rangées longitudinales de tubercules fortement carénés sur le dos


6 à 10 rangées longitudinales de tubercules sur la queue, au moins à la base



Patron dorsal formé de grandes taches sombres alignées et maculé de points blancs



**Pieds** : les lamelles digitales atteignent la base des orteils IV et V



## Geckos / GEKKONIDAE

ESPÈCE EXOTIQUE



2010

**GECKO MABOUIA**

*Hemidactylus mabouia*

NA

### Mensurations

Lmc nouveau-né : 20–24 mm

Lmc mâle adulte : 42 à 67,9 mm

Lmc femelle adulte : 42 à 72 mm

Ltotale maximale : 16,5 cm


Patron dorsal formé d'une  
alternance de chevrons  
clairs et sombres

Livrée sombre


Livrée claire

Aspect rugueux

Nombreux tubercules  
sur la nuque




**Mains** : doigts élargis en spatule, présentant  
quelques rangées de lamelles (~6–7)  
Doigts portant une longue griffe (dépassant  
largement des lamelles)



Main

**Pieds** : les lamelles digitales  
n'atteignent pas la base des  
orteils IV et V



Pied

## Geckos / GEKKONIDAE

ESPÈCE EXOTIQUE



**GECKO MUTILÉ**

*Gehyra mutilata*

**NA**

Corps d'aspect lisse, dépourvu de tubercules différenciés

Absence de motif symétrique ; souvent, présence de macules sombres

### Mensurations

Lmc nouveau-né : 17–24 mm

Ltotale nouveau-né : 38–49 mm


Lmc mâle adulte : 40,2–61 mm

Lmc femelle adulte : 38–61 mm

Ltotale adulte : jusqu'à 12,5 cm



Juvenile



Livrée claire





Livrée sombre

**Main** : seuls 4 doigts portent une griffe (dépassant des lamelles) ; le pouce est dépourvu de griffe



Main



Extrémité des doigts et orteils ronde

Souvent une ligne vertébrale claire

Base de la queue rétrécie, puis en forme de carotte

## Geckos / GEKKONIDAE

ESPÈCE EXOTIQUE



**GECKO DES SEYCHELLES**

*Phelsuma astriata semicarinata*


NA

### Mensurations

Lmc mâle adulte : jusqu'à 55 mm

Lmc femelle adulte : jusqu'à 56 mm


Ltotale adulte: 11-12,5 cm



Une bande brun gris latérale, bien marquée sur les flancs, sépare nettement le dos vert de la face ventrale blanchâtre

Bande rouge entre l'œil et le museau, longeant les supralabiales ;

Souvent une tache rouge en V sur le dessus de la tête



Présence possible de taches occipitales et de barres rouges en région temporale

Coloration générale vert clair à vert pomme, avec le plus souvent une fine ligne vertébrale rouge s'étendant de la nuque jusqu'au niveau des reins ; de part et d'autre, présence de taches rouges, plus ou moins marbrées ou vermiformes

## Geckos / GEKKONIDAE

ESPÈCE INDIGÈNE



### Mensurations

Lmc nouveau-né : 20 (?)–30 mm

Ltotale nouveau-né : 40–55 mm

Lmc mâle adulte : 54–83 mm

Lmc femelle adulte : 52–68 mm

Ltotale adulte : 11,5–18 cm

### GECKO DE BOURBON

*Phelsuma borbonica*


EN

Livrée vert à turquoise, très  
largement maculée de grandes  
taches rouge bordeaux

Tête sombre, ponctuée  
de bleu ou de vert

Queue souvent cyan

Souvent une bande  
dorso-latérale verte diffuse



Juvenile



Des études récentes montrent que les populations du Gecko vert de Bourbon sont fortement différenciées génétiquement, avec des échanges très limités même entre populations proches. Les analyses révèlent l'existence de deux grandes lignées génétiques séparées depuis au moins 500 000 ans, mais aussi de **cinq groupes génétiques distincts** à l'échelle de l'île. Cette diversité ne correspond pas à la classification actuelle en deux sous-espèces, qui est ainsi remise en question. Certaines populations isolées, notamment au Maïdo, au Cimendef et au Dimitile, présentent une faible connectivité et pourraient être plus vulnérables. Ces résultats soulignent l'existence de plusieurs unités évolutives distinctes devant être prises en compte dans les actions de conservation.

## Geckos / GEKKONIDAE

ESPÈCE EXOTIQUE

**GRAND GECKO VERT DE MADAGASCAR**

*Phelsuma grandis*

NA



1994

Le plus grand *Phelsuma* de La Réunion


### Mensurations

Lmc nouveau-né : 30–50 mm


Ltotale nouveau-né : 65–70 mm

Lmc adulte : 9,5–11,3 cm

Ltotale adulte : 20–33 cm



Ligne rouge épaisse  
présente entre l'œil  
et la narine



Nouveau-né

Coloration générale vert intense,  
parfois homogène mais le plus souvent  
ponctuée de taches rouges dorsales

## Geckos / GEKKONIDAE

ESPÈCE INDIGÈNE

**GECKO VERT DE MANAPANY**

*Phelsuma inexpectata*

CR



ENDÉMIQUE

### Mensurations


Ltotale nouveau-né : ~20 mm

Lmc mâle adulte : 42–62,5 mm

Lmc femelle adulte : 42–58 mm

Ltotale adulte : 8,5–13,5 cm

Coloration générale verte avec de nombreuses petites taches rouges sur la face dorsale



Une épaisse bande bordeaux à noire s'étend de l'œil jusqu'à la base du bras ; elle est surlignée d'une large bande blanche à cyan



Juvénile

Parfois une plage cyan sur la nuque (surtout chez les mâles)



Femelle



Mâle

Motif de la tête formé d'un triangle bleu (sur le museau) et de trois bandes rouges longitudinales, plus ou moins anastomosées, s'étendant jusqu'aux épaules

## Geckos / GEKKONIDAE

ESPÈCE EXOTIQUE



1975

### GECKO VERT POUSSIÈRE D'OR (GECKO À QUEUE LARGE)

NA

*Phelsuma laticauda laticauda*


#### Mensurations

Ltotale nouveau-né : 38–42 mm


Lmc adulte : 46–65 mm

Ltotale adulte : 10–13 cm


Face dorsale de la tête, du corps et de  
la queue verte



Face ventrale blanchâtre



La teinte générale peut devenir plus  
sombre et terne lors de certaines phases  
d'activité ou en situation de stress



Yeux entourés d'un anneau cyan

"Poussière d'or"

Taches ou bande rouges dans la  
partie basse du dos (évoquant  
souvent une griffure ensanglantée)

Queue large

## Geckos / GEKKONIDAE

ESPÈCE EXOTIQUE



**GECKO LIGNÉ**

*Phelsuma lineata*

NA

### Mensurations


Lmc nouveau-né : ~16 mm

Ltotale nouveau-né : 33–43 mm

Lmc adulte : jusqu'à 64 mm

Ltotale adulte : 10,5–14,5 cm

Souvent, une large tache rouge en forme de V sur le museau



Une bande noire épaisse latérale, sur le flanc, séparant nettement le dos vert du ventre jaune, s'élargissant à l'aîne (base de la cuisse)



Coloration générale verte avec une grande tache rouge dorsale, souvent bien définie vers l'avant du corps et fragmentée vers l'arrière



**CONFUSION POSSIBLE**

Très proche de *Phelsuma pusilla* par la coloration, mais s'en distingue par une taille adulte supérieure :

Lmc adulte (*P. lineata*) : jusqu'à 64 mm, contre 40 mm chez *P. pusilla*

## Geckos / GEKKONIDAE

ESPÈCE EXOTIQUE



2026

### GECKO VERT MINUSCULE

*Phelsuma pusilla pusilla*

NA


Coloration générale verte à beige avec de petites taches rouges dorsales irrégulières

#### Mensurations

Lmc adulte : jusqu'à 40 mm

Ltotale adulte : jusqu'à 85 mm

Bande rouge sur le museau et souvent des marques rougeâtres sur le cou derrière les yeux



Une bande noire épaisse latérale, sur le flanc, séparant nettement le dos vert du ventre jaune, s'élargissant à l'aîne (base de la cuisse)

Cercle orbital jaune

Queue d'origine fortement segmentée et souvent mouchetée



CONFUSION POSSIBLE

Très proche de *Phelsuma lineata* par la coloration, mais s'en distingue par une taille adulte nettement plus faible : Lmc adulte (*P. pusilla*) : jusqu'à 40 mm, contre 64 mm chez *P. lineata*. Une confusion avec les jeunes individus de *P. lineata* est donc possible.

## Geckos / GEKKONIDAE

ESPÈCE EXOTIQUE



2026

Mensurations

Ltotale adulte : 11–12,5 cm

### GECKO VERT À QUATRE OCELLES (GECKO DIURNE À QUATRE OCELLES)

NA

*Phelsuma quadriocellata bimaculata*

Coloration verte avec quelques taches  
rouges dorsales irrégulières ou parfois une  
ligne rouge interrompue

La coloration verte tend vers le bleu à  
l'arrière du corps et la queue est parfois  
bleue turquoise



Cercle orbital jaune

Absence de ligne sombre sur les flancs  
Ventre blanchâtre



Queue d'origine fortement  
segmentée (avec des anneaux  
d'écailles plus larges) et  
souvent turquoise

## Serpents / ELAPIDAE

ESPÈCE MARINE



### Mensurations

Lmc nouveau-né : 22–26 cm

Ltotale adulte : 64–110 cm

### HYDROPHIDE BICOLORE

*Hydrophis platura*

NE

Mœurs marines

Largement pélagique, l'espèce est parfois observée, en surface, parmi les bancs de Dauphins (notamment les Péponocéphales) ; elle peut occasionnellement être rencontrée à terre, "échouée" sur la plage

Attention, la morsure est venimeuse et très dangereuse



Inconfondable

Dos noir brillant avec deux bandes latérales jaunes

Ventre jaune, orangé ou brun.

Queue aplatie latéralement, en forme de palette ; elle est souvent blanche ou jaune mouchetée ou barrée de noir



Tête allongée avec un museau aplati en forme de "bec"



Queue aplatie latéralement

## Serpents / COLUBRIDAE

ESPÈCE EXOTIQUE



**COULEUVRE LOUP**  
(COULEUVRE AULIQUE)

NA

*Lycodon aulicus*

### Mensurations

Lmc nouveau-né : 14 cm



Ltotale adulte : 30-80 cm

Mœurs arboricoles et terrestres

Active surtout la nuit

Coloration miel à brune, marbrée ou annelée

Queue longue et fine



## Serpents / TYPHLOPIDAE

ESPÈCE EXOTIQUE



1862

**TYPHLOPS BRAHME**

*Indotyphlops braminus*

NA

Mœurs fouisseuses

Coloration dorsale marron lie-de-vin


Mensurations

Lmc nouveau-né : 3,5–7 cm

Ltotale adulte : 9,5–23 cm



Coloration bleue  
pendant la mue



Œil petit, positionné dans la  
moitié supérieure de l'échelle  
oculaire (deux fois plus  
haute que large)

Petites glandes claires ali-  
gnées en "collier de perles"  
sous les écailles céphaliques



Face ventrale de la tête  
et bouche



Cloaque et extrémité de la queue

## Tortues / GEOEMYDIDAE

ESPÈCE EXOTIQUE

**ÉMYDE À COU RAYÉ COMMUNE**

*Mauremys sinensis*

NA




### Mensurations

Lcarapace nouveau-né : 28–34 mm

Lcarapace mâle adulte : 9,5–20 cm

Lcarapace femelle adulte : 9,8–27 cm

Tête et cou ornés de nombreuses rayures fines longitudinales droites et relativement parallèles, alternativement claires et foncées, depuis le bout du museau jusqu'à la base du cou



Face ventrale

Plastron plus ou moins sombre avec des sutures largement marquées de blanc jaunâtre



Nouveau-né

## Tortues / EMYDIDAE

ESPÈCE EXOTIQUE



1989

**TRACHÉMYDE ÉCRITE**

*Trachemys scripta elegans*

NA


Tête et cou ornés de lignes longitudinales avec une longue tache temporale rouge

### Mensurations

Lcarapace nouveau-né : 23–35 mm

Lcarapace mâle adulte : 9–26,1 cm


Lcarapace femelle adulte : 16–32,8 cm



Femelle adulte

Forme mélanique

Les individus mélaniques présentent une tête sombre dépourvue de motifs




Queue longue

Mâle adulte

Griffes très longues



Face ventrale



Nouveau-né

## Tortues / EMYDIDAE

ESPÈCE EXOTIQUE

**TORTUE ÉTOILÉE DE MADAGASCAR**

*Astrochelys radiata*

NA



### Mensurations

Lcarapace nouveau-né : 32–43 mm

Lcarapace mâle adulte : 28,5–39,5 cm

Lcarapace femelle adulte : 24,2–48 cm

Mœurs diurnes

Carapace très bombée, presque en dôme chez l'adulte  
Chaque écaille, sombre (noire à brun foncé), est ornée de fines lignes jaunes rayonnantes formant un motif en étoile, régulier et bien contrasté, donnant à l'ensemble un aspect très géométrique. Sutures peu apparentes



Nouveau-né

*Astrochelys radiata* est aujourd'hui très largement présente en captivité chez les Réunionnais. Un article évoque une population d'environ 50 000 adultes sur l'île, avec près de 15 000 naissances annuelles. Le même article indique également que 30 000 à 50 000 Réunionnais posséderaient une Tortue étoilée.

Il n'est donc guère étonnant que l'espèce soit ponctuellement observée dans la nature, même s'il n'existe à ce jour aucune preuve de l'existence d'une population férale établie.

## Tortues marines / CHELONIIDAE

ESPÈCE MARINE

REPRODUCTION  
À LA RÉUNION

**TORTUE VERTE**  
**TORTI D'MER**

**EN**

*Chelonia mydas*

Carapace couverte de grandes  
plaques d'écailles

4 paires d'écailles  
costales

Museau à bec  
arrondi et  
denticulé

Une seule  
paire d'écailles  
préfrontales

**Mensurations**

Lcarapace nouveau-né : 2,5–5,9 cm

Lcarapace mâle adulte : > à 64 cm

Lcarapace femelle adulte : 65–153 cm

Nouveau-né

Coloration générale  
noire ou bleu nuit  
Dossière marginée  
de blanc ; gorge et  
ventre blancs

ESPÈCE MARINE

**TORTUE IMBRIQUÉE**  
**TORTUE CARET**

**CR**

*Eretmochelys imbricata*

Carapace couverte de grandes  
plaques d'écailles

4 paires d'écailles  
costales

Museau à bec  
allongé, fort et  
coupant

Deux paires  
d'écailles  
préfrontales

**Mensurations**

Lcarapace nouveau-né : 3,2–4,6 cm

Lcarapace mâle adulte : > à 65 cm

Lcarapace femelle adulte : 51–114 cm

Nouveau-né

Coloration générale  
brune à rousse  
Dossière non marginée  
de blanc ; gorge et  
ventre sombres

## Tortues marines / CHELONIIDAE

### ESPÈCE MARINE



#### Mensurations

Lcarapace nouveau-né : 3,6–5 cm

Lcarapace mâle adulte : > à 58 cm

Lcarapace femelle adulte : 52–76 cm


### TORTUE OLIVÂTRE

*Lepidochelys olivacea*



DD

Carapace couverte de grandes plaques d'écailles ; dossière olivâtre à ocre-brun

5 paires d'écailles costales ou plus, souvent asymétriques



2 paires d'écailles préfrontales



Nouveau-né

Coloration générale grise à olivâtre  
Dossière non marginée de blanc

### ESPÈCE MARINE



#### Mensurations

Lcarapace nouveau-né : 3,5–5,3 cm

Lcarapace adulte : 55–115 cm


### TORTUE CAOUANNE

*Caretta caretta*



DD

Carapace couverte de grandes plaques d'écailles  
Dossière brun-orangé à brun rougeâtre

5 paires d'écailles costales



Préfrontales fragmentées en plus de 4 plaques



Nouveau-né

Coloration générale brune à rousse  
Dossière non marginée de blanc

## Tortues marines / DERMOCHELYIDAE

### ESPÈCE MARINE




Dossière à l'aspect de cuir; dépourvue d'écailles, parcourue par 7 carènes longitudinales

### TORTUE LUTH

*Dermochelys coriacea*

NA

Tête et membres dépourvus d'écailles, de couleur bleu nuit moucheté de blanc




.....

### Mensurations

Lcarapace nouveau-né : 5,1–6,8 cm

Lcarapace mâle adulte : 1,25–2,43 m

Lcarapace femelle adulte : 1,25–1,92 m



Nouveau-né

Dossière couverte de petits granules accolés; 7 lignes longitudinales de granules blancs sur la dossière

**CITATION** : Dewynter, M., Baglan, A., Courtois, É., Frétey, T., Sanchez, M., Souchet, J. & Probst, J.-M. (2026) *Guide illustré des Reptiles & des Amphibiens de La Réunion*. *GoodID*, 27: 1-31.

**REMERCIEMENTS** : Les illustrations de ce guide reposent sur l'exploitation de centaines de clichés réalisés sur le terrain au cours des quinze dernières années. Merci à tous les naturalistes, herpétologues amateurs ou professionnels, qui ont parcouru La Réunion à la recherche des amphibiens et des reptiles et partagé leurs observations ainsi que leurs photographies : Guillaume Amirault, Morgane Barraud, Matteo Bellucci, Chloé Bernet, Sarah Caceres, Matthieu Claeys, Jean-François Cornuaille, Jane Cozette, Laurent Debordes, Aurélien Dessort, Pierre-Yves Fabulet, Joshua Fave-Le Gall, Thomas Guillemaud, Antoine Guilloux, Cédric Hoarau, Dominique Hoareau, Nicolas Huet, James Lefebvre, Rebecca Lippert, Jenni Ly, Cédric Mroczo, François Olliet, Julien Poirion, Martin Riethmuller, Markus Roesch, François Rousseu, Guillaume Roussel, Marc Salamolard, Pierre-Louis Stenger, Julien Triolo, François Vandeschricke et Valentin Vaslet. Merci également aux agents des services en charge de l'environnement qui ont soutenu ce projet.

Nos remerciements à l'équipe de la Société herpétologique de France qui a porté le projet : Anne Lombardi, Adèle Hurabielle, Isabelle Chauvin, Audrey Trochet et Myriam Labadesse.

Ce document a été financé par l'**Office français de la biodiversité** (OFB) et la **DEAL Réunion**. Ce guide est une composante du projet CLEF (Création d'outils pour L'identification des amphibiens et reptiles de France métropolitaine et de ses outre-mers) porté par la Société herpétologique de France en partenariat avec PatriNat (centre d'expertise et de données sur le patrimoine naturel). Sa vocation est de soutenir la science participative en permettant aux contributeurs de correctement identifier leurs observations d'amphibiens et de reptiles.

## NOS PARTENAIRES



Réunion des  
Musées  
Régionaux



l'observatoire des tortues marines



GoodID

## Découvrez la collection GoodID

Une ressource destinée aux naturalistes, gestionnaires d'espaces naturels, enseignants et à tous les passionnés de biodiversité.

<https://collection-goodid.fr>

L'ensemble des publications est consultable et téléchargeable gratuitement sur le site de la collection.

