



Rémy EUDELIN
Stéphane AUGROS
Antoine BAGLAN
Sacha LEWANDOWSKI
Thierry FRÉTEY
Maël DEWYNTER

GUIDE ILLUSTRÉ DES AMPHIBIENS & DES REPTILES DE MAYOTTE

Numéro Juillet 2026
29



MAYOTTE ET SON HERPÉTOFAUNE

Malgré une superficie modeste de 374 km², Mayotte abrite une herpétofaune remarquablement diversifiée.

Située dans le canal du Mozambique, entre Madagascar et la côte orientale de l'Afrique, l'île constitue la plus ancienne terre émergée de l'archipel des Comores. Son ancienneté géologique, estimée à près de vingt millions d'années, ainsi que sa position biogéographique particulière ont favorisé l'installation d'une faune terrestre originale, largement apparentée aux lignées malgaches.

Les colonisations naturelles, probablement facilitées par les courants marins, les radeaux de végétation et certains événements cycloniques, ont permis l'établissement d'une riche herpétofaune comprenant plusieurs geckos, serpents, amphibiens et un caméléon endémique. Plusieurs espèces sont strictement endémiques de Mayotte ou de l'archipel des Comores, tandis que certaines espèces introduites, notamment parmi les geckos et les serpents fouisseurs, témoignent de l'influence des activités humaines sur la composition actuelle des peuplements.

Malgré ces introductions, l'herpétofaune de Mayotte demeure largement dominée par des espèces indigènes et constitue l'un des ensembles les plus originaux de l'océan Indien occidental. L'urbanisation croissante, la transformation des habitats, les espèces introduites et les perturbations récentes, notamment le cyclone Chido en 2024, représentent toutefois des menaces importantes. L'amélioration des connaissances sur la répartition des espèces et le suivi des populations apparaissent aujourd'hui essentiels pour assurer la conservation de cette biodiversité insulaire exceptionnelle.



Mantelles / MANTELLIDAE

ESPÈCE ENDÉMIQUE



MANTEILLE DE NATALIA

EN

Blommersia nataliae

Allure générale de grenouille
Pieds avec une palmure basale
Très petite taille : Lmc ~ 18 à 23 mm



Mâles




Femelle

Zone loréale et lèvre supérieure entièrement noire



Glandes fémorales du mâle



Les femelles présentent une coloration orange vif sur le ventre et les parties cachées des cuisses

Mensurations

Lmc mâle adulte : 17,9–20,5 mm

Lmc femelle adulte : 19,6–23 mm

Mantelles / MANTELLIDAE

ESPÈCE ENDÉMIQUE



MANTELLE TRANSMARINE

LC

GRENOUILLE TRANSMARINE DE MAYOTTE

Blommersia transmarina

Allure générale de grenouille
Pieds avec une palmure basale
Petite taille : Lmc ~ 24 à 35 mm



Mâles



Tympan souligné
de blanc



Femelle



Mâle

Glandes
fémorales



Femelle

Mensurations

Lmc mâle adulte : 24,5–29 mm

Lmc femelle adulte : 26–34,5 mm

Mantelles / MANTELLIDAE

ESPÈCE ENDÉMIQUE



MANTELLE MARINE

LC

RAINETTE NAUTIQUE DE MAYOTTE

Boophis nauticus

Allure générale de rainette

Palmure entre les orteils bien développée

Disque adhésif à l'extrémité des doigts et orteils

Nocturne, terrestre et arboricole

Taille moyenne, Lmc ~ 37 à 58 mm



Grands yeux à iris rougeâtre
Tympan beige à marron

Mâles adultes :
grande diversité de patrons



Mâle en reproduction : coloration
jaune et face dorsale spinuleuse



Femelle
adulte

Mensurations

Lmc mâle adulte : 37–50 mm

Lmc femelle adulte : 56,1–58,5 mm

Serpents marins / ELAPIDAE

ESPÈCE MARINE



HYDROPHIDE BICOLORE

Hydrophis platura

NE

Mœurs marines

Largement pélagique, l'espèce est parfois observée, en surface, parmi les bancs de dauphins (notamment les Péponocéphales) ; elle peut occasionnellement être rencontrée à terre, "échouée" sur la plage

Mensurations

Lmc nouveau-né : 22–26 cm

Ltotale adulte : 64–110 cm

Attention, la morsure est venimeuse et très dangereuse



Inconfondable

Dos noir brillant avec deux bandes latérales jaunes

Ventre jaune, orangé ou brun.

Queue aplatie latéralement, en forme de palette ; elle est souvent blanche ou jaune mouchetée ou barrée de noir



Tête allongée avec un museau aplati en forme de "bec"



Queue aplatie latéralement

Couleuvres / LAMPROPHIIDAE

ESPÈCE INDIGÈNE



COULEUVRE TACHETÉE

NT

SERPENT DES COCOTIERS


Lycodryas maculata comorensis

Mœurs arboricoles mais peut être observée au sol
Nocturne, évolue dans la végétation basse
Couleuvre longue et fine



Femelle

Teinte orangée ou jaunâtre





Œil à pupille de chat

Mâle juvénile



Teinte grisâtre à marron

Mâle



Tête bien plus large que le cou

Mensurations

Ltotale nouveau-né : ~260 mm

Lmc adulte : 504–867 mm

Ltotale adulte : 655–1052 mm

Couleuvres / LAMPROPHIIDAE

ESPÈCE ENDÉMIQUE




COULEUVRE DE MAYOTTE

Liophidium mayottensis

EN


Mœurs terrestres ; diurne

Teinte dorsale marron ; l'avant du corps est grisâtre tandis que la teinte évolue vers le marron voire le roux vers la queue



Coloration ventrale blanche avec des petits points noirs sur les écailles ventrales

Pupille ronde et regard "sévère"



Tête aussi large que le cou

Mensurations

Lmc adulte 595–795 mm

Ltotale adulte : 841–1121 mm

Serpents aveugles / **TYPHLOPIDAE**

ESPÈCE INTRODUITE



TYPHLOPS BRAHME

Indotyphlops braminus


NA

Mœurs fouisseuses

Coloration dorsale marron lie-de-vin



Coloration bleue
pendant la mue




Œil petit, positionné dans la
moitié supérieure de l'écaille
oculaire (deux fois plus
haute que large)

Petites glandes claires
alignées en "collier de
perles" sous les écailles
céphaliques



Face ventrale de la tête
et bouche



Cloaque et extrémité de la queue

Mensurations

Lmc nouveau-né : 3,5–7 cm

Ltotale adulte : 9,5–23 cm

Serpents aveugles / **TYPHLOPIDAE**

ESPÈCE ENDÉMIQUE




TYPHLOPS DE MAYOTTE

Madatyphlops eudelini


DD

Mœurs fouisseuses


Coloration dorsale marron lie-de-vin, ponctuée de clair dans la partie antérieure



Écailles dorsales bicolores dans la partie antérieure du corps



Face ventrale de la tête blanche



Une bande blanche irrégulière, le long du ventre, s'étend de la tête à la queue



Face ventrale de la queue blanche

Mensurations

Ltotale adulte : 190,7 mm (N=1)

Caméléons / CHAMAELEONIDAE

ESPÈCE ENDÉMIQUE



CAMÉLÉON DE MAYOTTE

LC

Furcifer polleni

Mœurs arboricoles et diurnes

Doigts disposés en pince opposable

Yeux mobiles indépendamment


Corps comprimé latéralement

Queue préhensile, souvent enroulée




Mâle au repos de nuit

Mâle au repos de nuit




Taches rouges

Femelle au repos de nuit



Mâle actif de jour



Mensurations

Ltotale nouveau-né : ~47 mm

Lmc mâle adulte : 69–104 mm

Lmc femelle adulte : 53–76 mm

Ltotale mâle adulte : 141–211 mm

Ltotale femelle adulte : 107–148 mm

Scinques / SCINCIDAE

SOUS-ESPÈCE ENDÉMIQUE

SCINQUE DE BOUTON MAHORAIS

NT

SCINQUE MARITIME

Cryptoblepharus boutonii mayottensis



Mœurs terrestres et diurnes
Petit scinque discret, très fin et élancé, uniquement présent sur la bande côtière et particulièrement dans la zone intertidale

Œil toujours apparent, la paupière inférieure étant fixe et transparente, formant une véritable "fenêtre" protectrice



Quatre bandes longitudinales crème s'étendant de la tête à la base de la queue



Mensurations

Lmc adulte : 37–44 mm

Ltotale adulte : 88–100 mm

Scinques / SCINCIDAE

ESPÈCE INDIGÈNE



SCINQUE D'ANJOUAN

"Flexiseps" johannae

LC


Mœurs fouisseuses
Souvent dissimulé dans la litière ou sous des refuges
(troncs morts, déchets...)
Déplacements sont rapides et ondulants

Petit lézard à la coloration générale
marron avec un motif marbré, ou
formant parfois de fines rayures
longitudinales.

Corps très allongé et membres
proportionnellement très petits





Queue régénérée



Très souples, les *Flexiseps*
peuvent tordre leur corps

Queue d'origine, très longue



Mensurations

Lmc adulte : 71–115 mm

Ltotale adulte : 175–218 mm

Scinques / SCINCIDAE

ESPÈCE INDIGÈNE



SCINQUE COMORIEN

SCINQUE DES COMORES

LC


Trachylepis comorensis

Mœurs terrestres et diurnes
Scinque le plus visible et le plus actif de l'archipel

Lézard héliophile, principalement terrestre, mais
grimpant volontiers sur les rochers ou les troncs

Corps robuste "en boudin" avec
des membres bien développés

Écailles dorsales souvent multi-carénées : présence
de 3 à 5 petites crêtes longitudinales par écaille, leur
donnant un aspect mat ou rugueux selon la lumière



Régions temporale et
tympanique souvent plus
sombres et ponctuées de
petites taches blanches
brillantes

Face ventrale blanchâtre à jaunâtre
(parfois bleuâtre)

Mensurations

Lmc adulte : 90–112 mm

Ltotale adulte : 210–236 mm

Geckos / GEKKONIDAE

ESPÈCE INDIGÈNE



GECKO SAFARI

GECKO SANS ONGLES VOYAGEUR

VU

Ebenavia safari

Petit gecko élancé, arboricole et nocturne

Dos : deux larges bandes dorsolatérales claires, sur fond plus sombre

Tête : contraste marqué entre la zone loréale sombre ("joue") et le dessus de la tête, plus clair, séparés par une fine ligne blanche



Mâle




La queue régénérée est orangée avec des motifs zébrés sombres



Femelle

Présence de deux disques adhésifs à l'extrémité des doigts des mains et des pieds



Pied

Mensurations

Lmc mâle adulte : 31–39,5 mm

Lmc femelle adulte : 31–39,5 mm

Ltotale adulte : jusqu'à 80 mm

Geckos / GEKKONIDAE

ESPÈCE ENDÉMIQUE



GECKO ÉTOILÉ

VU

GECKO NOCTURNE DE MAYOTTE

Paroedura stellata

Gecko nocturne, de mœurs arboricoles mais se déplaçant aussi au sol

Allure de petit caïman : tête triangulaire robuste, bien distincte du cou

Quatre bandes transversales plus claires (blanchâtres) brillantes sur le dos, bien visibles la nuit

Corps couvert de nombreux tubercules coniques carénés et alignés

Queue très épineuse, souvent dressée verticalement




Sacs postanaux (mâles)
à l'origine du nom de
genre



Parfois présence de points blancs
donnant un aspect "étoile"



Présence de deux disques
adhésifs à l'extrémité des
doigts des mains et des
pieds



Main

Mensurations

Ltotale nouveau-né : 36–37 mm

Lmc adulte : 34,8–61,6 mm

Ltotale adulte : 110–124 mm

Geckos / GEKKONIDAE

ESPÈCE INDIGÈNE



GECKO DE HUMBLLOT

GECKO À ÉCAILLES DE HUMBLLOT



LC

Geckolepis humbloti

Gecko nocturne, de mœurs arboricoles



Écailles larges,
cycloïdes,
superposées



Lorsqu'il est capturé, *Geckolepis* présente un mécanisme de défense spectaculaire : au moindre contact, ses écailles se détachent, laissant apparaître une peau nue et rosée. Cette perte d'écailles permet au gecko d'échapper au prédateur. Les écailles se régénèrent ensuite, sans cicatrice, en quelques semaines.

Comme chez de nombreux geckos, il peut également perdre sa queue, qui repoussera.

Mensurations

Lmc adulte : jusqu'à 65 mm

Ltotale adulte : jusqu'à 124 mm

Geckos / GEKKONIDAE

ESPÈCE INTRODUITE




GECKO BRIDÉ


Hemidactylus frenatus

NA

Absence de tubercules sur la nuque (aspect velouté) et quelques rangées de petits tubercules sur le corps




Points clairs alignés



Absence de tubercules sur la nuque

Aspect velouté

Bande claire soulignée de sombre de part et d'autre de l'œil



Mains : doigts élargis en spatule, présentant quelques rangées de lamelles (~6-7)
Doigts portant une longue griffe (dépassant largement des lamelles)



Main

Pieds : les lamelles digitales atteignent la base des orteils IV et V

Mensurations


Lmc nouveau-né : 22 mm

Ltotale nouveau-né : 27-34 mm

Lmc mâle adulte : 35-67 mm

Lmc femelle adulte : 39-61 mm

Ltotale adulte : jusqu'à 14 cm



Pied

Geckos / GEKKONIDAE

ESPÈCE INTRODUITE

GECKOS MERCATOR / MABOUIA

NA

Complexe *Hemidactylus mercatorius* /
Hemidactylus mabouia

~ 1884

Patron dorsal formé d'une alternance de chevrons clairs et sombres

Épines coniques
nombreuses tout le
long de la queue

Livrée sombre

Livrée claire

Nombreux tubercules
sur la nuque

Aspect rugueux

Profil du museau
pointu

Mains : doigts élargis en spatule, présentant
quelques rangées de lamelles (~6-7)
Doigts portant une longue griffe (dépassant
largement des lamelles)

Pieds : les lamelles digitales n'atteignent pas
la base des orteils IV et V



Mensurations (*Hemidactylus mabouia*)

Lmc mâle adulte : 38,5-59,9 mm

Lmc femelle adulte : 40-57,6 mm

Ltotale mâle adulte : 86-124,6 mm

Ltotale femelle adulte : 87-101,6 mm



Geckos / GEKKONIDAE

ESPÈCE CRYPTOGENÈ




GECKO À TÊTE PLATE

NA

Hemidactylus platycephalus

Le statut à Mayotte (indigène ou introduit) est encore débattu

Grand gecko nocturne largement répandu





Épines coniques uniquement à la base de la queue

Queue pratiquement toujours lisse car régénérée

Ligne blanche discontinue très régulière (— — —)



Dépression interorbitale bien marquée



Profil du museau arrondi

Pieds : les lamelles digitales n'atteignent pas la base des orteils IV et V


Mensurations

Lmc mâle adulte : 65–85,2 mm

Lmc femelle adulte : 64,6–76,9 mm

Lmc adulte : 57,7–85,2 mm

Ltotale adulte : 107–184 mm



Geckos / GEKKONIDAE

ESPÈCE INTRODUITE



2026

GECKO MUTILÉ

Gehyra mutilata

NA

Gecko nocturne détecté très récemment à Mayotte
Uniquement signalé dans les habitations humaines

Corps d'aspect lisse, dépourvu de tubercules différenciés

Absence de motif symétrique mais, souvent, présence de macules sombres

Souvent une
ligne vertébrale
claire

Base de la queue
rétrécie, puis en
forme de carotte

Livrée claire

Livrée sombre,
tachetée

Juvenile

Main : seuls 4 doigts portent
une griffe (dépassant des
lamelles) ; le pouce est
dépourvu de griffe

Main

Mensurations

Lmc nouveau-né : 17–24 mm

Ltotale nouveau-né : 38–49 mm

Lmc adulte : 38–61 mm

Ltotale adulte : jusqu'à 12,5 cm

Geckos / GEKKONIDAE

ESPÈCE INTRODUITE



~1903

GECKO SOMBRE

Phelsuma dubia

NA

Trapu et relativement grand

Coloration des adultes vert pâle la majorité du temps avec quelques individus plus vifs
Juvénile gris-bleu avec des taches plus claires

Nombreuses taches rouges sur la partie dorsale s'effaçant en remontant vers la nuque

Yeux cerclés de bleu



Ventre blanc à jaunâtre

Dos constellé de taches bleues

Queue jaune



Nouveau-né

Coloration dorsale verte avec des nuances olive, brunes, ou turquoise



Queue parfois bleuâtre

Mensurations

Lmc nouveau-né : ~21 mm

Ltotale nouveau-né : 35-46 mm

Lmc adulte : jusqu'à 68 mm

Ltotale adulte : jusqu'à 154 mm

Geckos / GEKKONIDAE

ESPÈCE INTRODUITE



GECKO POUSSIÈRE D'OR


NA

GECKO À QUEUE LARGE


Phelsuma laticauda

Principalement diurne, mais peut être actif la nuit dans les environnements éclairés


Face dorsale de la tête, du corps et de la queue verte



Face ventrale blanchâtre



En situation de stress, la teinte générale s'assombrit et perd de son éclat



Yeux entourés d'un anneau cyan

"Poussière d'or"

Trois taches rouges évoquant une griffure ensanglantée

Mensurations

Ltotale nouveau-né : 38–42 mm

Lmc adulte : 46–65 mm

Ltotale adulte : 100–130 mm

Geckos / GEKKONIDAE


ESPÈCE ENDÉMIQUE



GECKO À BANDES NOIRES

Phelsuma nigristriata

VU



Mensurations

Ltotale nouveau-né : 35–37 mm

Lmc adulte : 40,5–46 mm

Ltotale adulte : 86,5–110 mm

Geckos / GEKKONIDAE


ESPÈCE ENDÉMIQUE



GECKO DE PASTEUR

Phelsuma pasteuri

NT



Zone bleu turquoise

Taches rouges sur le dos



Parfois, une ligne médio-dorsale rouge

Mensurations

Lmc adulte : 42–53 mm

Ltotale : 89–115 mm

Geckos / GEKKONIDAE

ESPÈCE ENDÉMIQUE



GECKO DE MERTENS

LC

GECKO DIURNE À LIGNE DORSALE ROUGE


Phelsuma robertmertensi



Flancs mouchetés
de blanc




Ébauche de bande
vertébrale déjà visible



Nouveau-né

Bande vertébrale, ou
alignement de points
ou de traits, rouges

Parfois, très pâle en
livrée nocturne



Mensurations

Lmc nouveau-né : 19–22 mm

Ltotale nouveau-né : 28–34 mm

Lmc adulte : jusqu'à 50 mm

Ltotale adulte : 70–110 mm

Tortues marines / CHELONIIDAE

ESPÈCE MARINE

REPRODUCTION
À MAYOTTE

TORTUE VERTE

NE

TORTUE FRANCHE, NYAMBA

Chelonia mydas

Carapace couverte de grandes
plaques d'écailles

4 paires d'écailles
costales

Museau à bec
arrondi et
denticulé

Une seule
paire d'écailles
préfrontales

Mensurations

Lcarapace nouveau-né : 2,5–5,9 cm

Lcarapace mâle adulte : > à 64 cm

Lcarapace femelle adulte : 65–153 cm

Nouveau-né

Coloration générale
noire ou bleu nuit
Dossière marginée
de blanc ; gorge et
ventre blancs

ESPÈCE MARINE

REPRODUCTION
À MAYOTTE

TORTUE IMBRIQUÉE

NE

NYAMBA MALI

Eretmochelys imbricata

Carapace couverte de grandes
plaques d'écailles

4 paires d'écailles
costales

Museau à bec
allongé, fort et
coupant

Deux paires
d'écailles
préfrontales

Mensurations

Lcarapace nouveau-né : 3,2–4,6 cm

Lcarapace mâle adulte : > à 65 cm

Lcarapace femelle adulte : 51–114 cm

Nouveau-né

Coloration générale
brune à rousse
Dossière non marginée
de blanc ; gorge et
ventre sombres

Tortues marines / CHELONIIDAE

ESPÈCE MARINE




TORTUE OLIVÂTRE

Lepidochelys olivacea


NE

Carapace couverte de grandes plaques d'écailles ; dossière olivâtre à ocre-brun

5 paires d'écailles costales ou plus, souvent asymétriques



2 paires d'écailles préfrontales




Mensurations

Lcarapace nouveau-né : 3,6–5 cm

Lcarapace mâle adulte : > à 58 cm

Lcarapace femelle adulte : 52–76 cm



Nouveau-né

Coloration générale grise à olivâtre
Dossière non marginée de blanc

ESPÈCE MARINE




TORTUE CAOUANNE

Caretta caretta


NE

Carapace couverte de grandes plaques d'écailles
Dossière brun-orangé à brun rougeâtre

5 paires d'écailles costales




Préfrontales fragmentées en plus de 4 plaques



Mensurations

Lcarapace nouveau-né : 3,5–5,3 cm

Lcarapace adulte : 55–115 cm



Nouveau-né

Coloration générale brune à rousse
Dossière non marginée de blanc

Tortues marines / DERMOCHELYIDAE

ESPÈCE MARINE




Dossière à l'aspect de cuir; dépourvue d'écailles, parcourue par 7 carènes longitudinales

TORTUE LUTH

Dermochelys coriacea

NE

Tête et membres dépourvus d'écailles, de couleur bleu nuit moucheté de blanc



.....

Mensurations

Lcarapace nouveau-né : 5,1–6,8 cm

Lcarapace mâle adulte : 1,25–2,43 m

Lcarapace femelle adulte : 1,25–1,92 m



Nouveau-né

Dossière couverte de petits granules accolés ; 7 lignes longitudinales de granules blancs sur la dossière

Statuts de conservation UICN

Le statut de conservation UICN de chaque espèce est indiqué dans le coin supérieur droit des fiches. Il s'agit du statut national applicable à Mayotte, établi en 2026 (à paraître) dans le cadre de la Liste rouge des reptiles et amphibiens de Mayotte (Augros S., Lewandowski S. & Hawlitscheck O., *com. pers.*). Les espèces exotiques sont considérées comme NA (non applicable).

- **LC** Préoccupation mineure : espèce non menacée.
- **NT** Quasi menacée : espèce proche d'être menacée.
- **VU** Vulnérable : espèce menacée. Situation inquiétante mais non critique.
- **EN** En danger : espèce menacée. Situation très inquiétante.
- **CR** En danger critique d'extinction : espèce menacée proche de l'extinction.
- **NA** Espèce très occasionnelle, visiteuse ou introduite.
- **DD** Données insuffisantes pour évaluer les menaces.
- **NE** Non évalué.

CITATION : Eudeline, R., Augros, S., Baglan, A., Lewandowski, S., Frétey, T. & Dewynter, M. (2026) Guide illustré des Amphibiens & des Reptiles de Mayotte. *GoodID*, **29**: 1–31.

REMERCIEMENTS

Les illustrations de ce guide sont basées sur l'exploitation de centaines de clichés réalisés sur le terrain ces quinze dernières années. Merci aux naturalistes, herpétologues amateurs ou professionnels, qui ont parcouru Mayotte à la recherche des amphibiens et des reptiles et partagé leurs observations et leurs photos : Thomas Allement, Dina Andrianaivoravelona, Anja Binging, Alicia Bonanno, Matthias Deuss, Pierre-Yves Fabulet, Lisa Faipoux, Jesus Rincon Gallego, Franck Glaw, Anrif Hamidou, Oliver Hawlitschek, Cédric Hoarau, Jean-Sébastien Philippe, Attila Kobori, Arnaud Le Goff, Paul Mathieu, Ludovic Montfort, François-Elie Paute, Sohan Sauroy-Toucouère, Mark D. Scherz, Ombeline Sculfort, Olivier Soumille, Gurvan Stephan et Cynthia Wang. Merci également aux agents des services en charge de l'environnement qui ont soutenu ce projet et à Ombeline Sculfort pour sa relecture attentive.

Nos remerciements vont à l'équipe de la **Société herpétologique de France** qui a porté le projet : Anne Lombardi, Adèle Hurabielle, Isabelle Chauvin, Audrey Trochet et Myriam Labadesse. Nous remercions également Stéphane Ciccione pour les informations relatives au statut des tortues marines.

Plus largement, nous remercions l'ensemble des auteurs du projet "CLEF océan Indien", qui ont indirectement contribué à ce guide au travers des échanges consacrés à la faune réunionnaise : Élodie Courtois, Mickaël Sanchez, Jérémie Souchet et Jean-Michel Probst.

Toute notre reconnaissance va au BHL Consortium, qui rend librement accessibles, sur son site **Biodiversity Heritage Library**, de nombreux ouvrages et articles scientifiques souvent introuvables par ailleurs. Cette mise à disposition des connaissances constitue une ressource particulièrement précieuse.

Ce document a été financé par l'**Office français de la biodiversité** (OFB) et la **DEALM Mayotte**. Ce guide constitue une composante du projet CLEF (Création d'outils pour l'identification des amphibiens et reptiles de France hexagonale et de ses outre-mer), porté par la Société herpétologique de France en partenariat avec PatriNat, centre d'expertise et de données sur le patrimoine naturel.

Sa vocation est de soutenir la science participative en permettant aux contributeurs d'identifier correctement leurs observations d'amphibiens et de reptiles.



Ce document a été financé par l'**Office français de la biodiversité** (OFB).



NOS PARTENAIRES



Réunion des
Musées
Régionaux



l'observatoire des tortues marines



Découvrez la collection GoodID

Une ressource destinée aux naturalistes, gestionnaires d'espaces naturels, enseignants et à tous les passionnés de biodiversité.

L'ensemble des publications est consultable et téléchargeable gratuitement sur le site de la collection.

